



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.



Plastia extraperitoneal de hernia epigástrica y diástasis de rectos con malla sublay por laparoscopia: Reporte de caso

Miguel Angel Reyes, Fernando Quijano, Ángel Martínez, Beatriz de Rienzo, Gabriel Kraus, Esmeralda Romero, Daniel Margain

CENTRO MÉDICO ABC I.A.P.



CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS

DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018 BOCA DEL RÍO, VERACRUZ



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

Plastia extraperitoneal de hernia epigástrica y diástasis de rectos con malla sublay por laparoscopia: Reporte de caso

Miguel Angel Reyes, Fernando Quijano, Ángel Martínez, Beatriz de Rienzo, Gabriel Kraus, Esmeralda Romero, Daniel Margain



Introducción

Material y métodos

Se han descrito múltiples técnicas para reparación de hernias incisionales, desde el cierre primario hasta abordajes laparoscópicos y robóticos. En la actualidad no existe una técnica estandarizada aceptada por la comunidad quirúrgica para abordaje laparoscópico. El uso de mallas se ha convertido en la piedra angular de cualquier tipo de abordaje.

Resultados

Resultados

Mostrar la reparación exitosa de defecto herniario incisional y diástasis de rectos por abordaje laparoscópico extraperitoneal y colocación de malla sublay.

Conclusiones



CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS
DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018 BOCA DEL RÍO, VERACRUZ



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

Plastia extraperitoneal de hernia epigástrica y diástasis de rectos con malla sublay por laparoscopia: Reporte de caso

Miguel Angel Reyes, Fernando Quijano, Ángel Martínez, Beatriz de Rienzo, Gabriel Kraus, Esmeralda Romero, Daniel Margain



Introducción

Material y métodos

Masculino de 50 años. Antecedente de funduplicatura tipo Nissen en 2 ocasiones hace 14 y 9 años, apendicectomía hace 27 años, reparación de hernia epigástrica hace 9 años. Diástasis de rectos conocida.

Resultados

Resultados

Presentó dolor en hipocondrio asociado a colecistitis, conocido con defecto herniario epigástrico recidivante sin síntomas asociados. Se programa a cirugía para realizar colecistectomía y plastia epigástrica por laparoscopia tipo TEP y reparación de diástasis de rectos.

Conclusiones



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

Plastia extraperitoneal de hernia epigástrica y diástasis de rectos con malla sublay por laparoscopia: Reporte de caso

Miguel Angel Reyes, Fernando Quijano, Ángel Martínez, Beatriz de Rienzo, Gabriel Kraus, Esmeralda Romero, Daniel Margain



Introducción

Material y métodos

Resultados

Resultados

Conclusiones

Se realiza colecistectomía por técnica habitual. Se retira trocar umbilical y se procede a abordaje de espacio retrorectal transumbilical, se introduce lente 5mm observando adecuado espacio entre músculo y fascia posterior y se dan 4 disparos con engrapadora automática y cartucho 60mm hasta zona subxifoidea logrando transección de línea media creando espacio para malla retrorectal. Se introducen 2 trocares accesorios 5mm dentro de la vaina del recto y se refuerza línea media inferior con PDS 2-0 con sujete continuo. Se introduce malla BardSoft de 16x12cm, se ajusta a espacio retrorectal y se fija con Histoacryl. Se corrobora situación de la malla y hemostasia. Cierre de puerto umbilical con PDS, piel con monocryl 4-0 subcuticular.



DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018

CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

Plastia extraperitoneal de hernia epigástrica y diástasis de rectos con malla sublay por laparoscopia: Reporte de caso

Miguel Angel Reyes, Fernando Quijano, Ángel Martínez, Beatriz de Rienzo, Gabriel Kraus, Esmeralda Romero, Daniel Margain



Introducción

Material y métodos

Resultados

Resultados

Conclusiones

Se han descrito múltiples técnicas y abordajes para reparar hernias ventrales. A la fecha no existe un consenso en la técnica que debe seguirse, por lo que consideramos que el caso presentado muestra la efectividad de una nueva técnica para reparación y plastia de pared abdominal.



DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018

CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ