

ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.



Cirugía General
Hospital 1° de Octubre

TIROIDECTOMÍA TRANSORAL ENDOSCÓPICA POR ABORDAJE VESTIBULAR (TOETVA); SERIE DE 8 CASOS


Pablo Flores Abrajan, Eduardo Torices Dardón, José Luis Peña Quan,
Manuel Alfonso Peña Vergara
Hospital Regional 1° Octubre



CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS

DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

TIROIDECTOMÍA TRANSORAL ENDOSCÓPICA POR ABORDAJE VESTIBULAR (TOETVA); SERIE DE 8 CASOS

Pablo Flores Abrajan, Eduardo Torices Dardón, José Luis
Peña Quan, Manuel Alfonso Peña Vergara



Cirugía General
Hospital 1° de Octubre

Introducción

Material y métodos

Resultados

Resultados

Conclusiones

- Desde hace aproximadamente 20 años se han venido realizando varias técnicas de tiroidectomía por mínimo acceso, apoyadas en la videoendoscopia en pro de reemplazar la incisión clásica descrita por Kocher. Se han diseñado múltiples abordajes, sin embargo, ninguno ha conseguido evitar totalmente las cicatrices. En el año 2008 Witzel introdujo la técnica transoral y en el 2015, Anuwong publicó la primera serie realizada en humanos.

En nuestro hospital se ha vivido de manera real esta evolución y actualmente se considera como un referente las maniobras terapéuticas que se desarrollan en nuestros servicios de cirugía y Oncología Quirúrgica.



DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018

CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

TIROIDECTOMÍA TRANSORAL ENDOSCÓPICA POR ABORDAJE VESTIBULAR (TOETVA); SERIE DE 8 CASOS

Pablo Flores Abrajan, Eduardo Torices Dardón, José Luis
Peña Quan, Manuel Alfonso Peña Vergara



Cirugía General
Hospital 1° de Octubre

Introducción

Material y métodos

Resultados

Resultados

Conclusiones

- Estudio Retrospectivo de 8 paciente intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Regional Primero de Octubre. Analizando tiempo quirúrgico, cantidad de sangrado, tipo Histológico, estancia hospitalaria, complicaciones.



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

TIROIDECTOMÍA TRANSORAL ENDOSCÓPICA POR ABORDAJE VESTIBULAR (TOETVA); SERIE DE 8 CASOS

Pablo Flores Abrajan, Eduardo Torices Dardón, José Luis
Peña Quan, Manuel Alfonso Peña Vergara



Introducción

Material y métodos

Resultados

Resultados

Conclusiones

- En nuestra serie de operaron 8 paciente de hemitiroidectomia, tiempo quirúrgico 90 minutos, sangrado 30 ml, sin necesidad de drenajes, sin disfonía, sin hipocalcemia, estancia hospitalaria 24 hrs, parestesia de labio inferior temporal 3 semanas, 7 benignos, 1 carcinoma papilar con adenoma de paratiroides.



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

TIROIDECTOMÍA TRANSORAL ENDOSCÓPICA POR ABORDAJE VESTIBULAR (TOETVA); SERIE DE 8 CASOS

Pablo Flores Abrajan, Eduardo Torices Dardón, José Luis Peña Quan, Manuel Alfonso Peña Vergara



Introducción

Material y métodos


Resultados

Resultados

Conclusiones



| | |
|--|---|
| Tiempo quirurgico (min.) | 90 |
| Sangrado reportado (cc) | 30 |
| Manejo del dolor | Analgesia habitual, suspendida al tercer día. |
| Tono de la Voz | Sin cambio en todos los pacientes. |
| Inicio de la Vía Oral (hrs.) | 24 |
| Datos clínicos o laboratoriales de Hipocalcemia. | No |
| Tipo Histológico | 7 benignos, 1 Carcinoma Papilar |
| Complicaciones | 1,paciente, parestesia de labio inferior temporal 3 semanas |



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

TIROIDECTOMÍA TRANSORAL ENDOSCÓPICA POR ABORDAJE VESTIBULAR (TOETVA); SERIE DE 8 CASOS

Pablo Flores Abrajan, Eduardo Torices Dardón, José Luis
Peña Quan, Manuel Alfonso Peña Vergara



Cirugía General
Hospital 1° de Octubre

Introducción

Material y métodos

Resultados

Resultados

Conclusiones

- TOETVA se puede realizar de forma segura con excelentes resultados cosméticos, proporcionando buenos resultados oncológicos. Tanto en nuestra experiencia como en la revisión de la literatura, TOETVA es una de las tiroidectomías endoscópicas transorales que pueden considerarse ya no como una operación experimental, la única que potencialmente está totalmente libre de cicatrices, ofreciendo seguridad y resultados. Se puede realizar en la práctica clínica real en pacientes seleccionados con pocas complicaciones, similar a la tiroidectomía abierta estándar.



DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018

CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ