

ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.



Etiología del síndrome icterico de origen obstructivo en pacientes tratados en el servicio de cirugía general de un Centro Institucional en México. Experiencia en un año.

Menjivar Rivera OM, Escobedo Sánchez E, Arcos Vera B, Betancourt Angeles M.

Centro Médico ISSEMyM Toluca.



CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS
BOCA DEL RÍO, VERACRUZ

DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

Etiología del síndrome icterico de origen obstructivo. Experiencia en un año.

Menjivar Rivera OM, Escobedo Sánchez E, Arcos Vera B, Betancourt Angeles M.



Introducción

- En México, los tumores malignos constituyen la tercera causa de muerte a nivel general, tanto en hombres como en mujeres. De éstos, el cáncer de páncreas constituye el 6° lugar, lo que corresponde un 5.2 % de las defunciones por cáncer en hombres y un 5.4 % en mujeres. A nivel gastrointestinal constituye la tercera causa de muerte por cáncer sólo detrás del cáncer gástrico y del cáncer de hígado y de vías biliares intrahepáticas.

Material y métodos

Resultados


Resultados

Conclusiones

- Presentar un cartel en el que se muestre la etiología más frecuente de síndrome icterico de origen obstructivo en pacientes tratados en el servicio de cirugía general de un Centro Institucional en México.



CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS
DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018 BOCA DEL RÍO, VERACRUZ



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

Etiología del síndrome icterico de origen obstructivo. Experiencia en un año.

Menjivar Rivera OM, Escobedo Sánchez E, Arcos Vera B, Betancourt Angeles M.



Introducción

Material y métodos

Resultados

Resultados

Conclusiones

- Se obtuvieron un total de 137 pacientes en la muestra inicial, con 63 pacientes excluidos del estudio (Cuadro 1). Se incluyeron un total de 74 pacientes con diagnóstico de ingreso de ictericia obstructiva, con un total de 40 mujeres (56 %) y 34 hombres (44 %), con una edad promedio de 55.2 años, con un rango entre 22 y 88 años. Para las mujeres, la edad promedio fue de 55.6 años con un rango de 22 a 88 años y para los hombres, una edad promedio de 54.6 años con un rango de 33 a 82 años.



DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018

CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

Etiología del síndrome icterico de origen obstructivo. Experiencia en un año.

Menjivar Rivera OM, Escobedo Sánchez E, Arcos Vera B, Betancourt Angeles M.



Introducción

Material y métodos

Resultados

Resultados

Conclusiones


- Se obtuvieron un total de 137 pacientes en la muestra inicial, con 63 pacientes excluidos del estudio (Cuadro 1). Se incluyeron un total de 74 pacientes con diagnóstico de ingreso de ictericia obstructiva, con un total de 40 mujeres (56 %) y 34 hombres (44 %), con una edad promedio de 55.2 años, con un rango entre 22 y 88 años. Para las mujeres, la edad promedio fue de 55.6 años con un rango de 22 a 88 años y para los hombres, una edad promedio de 54.6 años con un rango de 33 a 82 años.



DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018

CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ



Etiología del síndrome ictérico de origen obstructivo. Experiencia en un año.

Menjivar Rivera OM, Escobedo Sánchez E, Arcos Vera B, Betancourt Angeles M.



Introducción


Material y métodos

Resultados

Resultados

Conclusiones

Enfermedad maligna		Enfermedad Benigna	
Diagnóstico	Pacientes	Diagnóstico	Pacientes
Cáncer de páncreas	15 (48 %)	Coledocolitiasis	39 (91 %)
Cáncer de vesícula biliar	2 (7 %)	Síndrome de Mirizzi	4 (9 %)
Colangiocarcinoma	10 (32 %)	Total	43 (100 %)
Adenocarcinoma del ámpula de Vater.	4 (13 %)		
Total	31 (100 %)		



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

Etiología del síndrome icterico de origen obstructivo. Experiencia en un año.

Menjivar Rivera OM, Escobedo Sánchez E, Arcos Vera B, Betancourt Angeles M.



Introducción

Material y métodos

Resultados

Resultados

Conclusiones

- La principal etiología de síndrome colestásico en la población estudiada fue la benigna (58 %), la población con diagnóstico final de enfermedad maligna presentó mayores cifras en promedio de CA 19-9, mayor edad y predominio en el sexo femenino.



DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018

CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ