



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

HOSPITAL GENERAL DE ECATEPEC

"LAS AMÉRICAS"



CIRUGÍA GENERAL

PLASTIA INGUINAL TIPO TAPP EN HERNIA DE AMYAND

STEPHANIE SERRANO COLLAZOS, MEZA JASSO MANUEL ALEJANDRO, MIGUEL ORTIZ ZARATE,
ROBERTO GONZALEZ SANTAMARIA
Hospital General Ecatepec "Las Americas"



CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS

DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018 BOCA DEL RÍO, VERACRUZ



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

PLASTIA INGUINAL TIPO TAPP EN HERNIA DE AMYAND

STEPHANIE SERRANO COLLAZOS, MEZA JASSO MANUEL
ALEJANDRO, MIGUEL ORTIZ ZARATE, ROBERTO GONZALEZ
SANTAMARIA



Introducción

Material y métodos

Resultados

Resultados

Conclusiones

- La hernia de Amyand es una entidad poco frecuente, ya que se estima una incidencia del 0.28% al 1% del total de las hernias inguinales.
- Normalmente se trata de una hernia inguinal que contiene el apéndice vermiforme sin inflamación y es un hallazgo casual durante la intervención quirúrgica.
- Se trata de una rara entidad que de forma habitual se diagnostica intraoperatoriamente, ya que un diagnóstico preparatorio es excepcional, solo se han descrito cuatro casos.

- Objetivo / Propósito (lo que quepa en recuadro // helvetica 36 puntos)



DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018

CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

PLASTIA INGUINAL TIPO TAPP EN HERNIA DE AMYAND

STEPHANIE SERRANO COLLAZOS, MEZA JASSO MANUEL
ALEJANDRO, MIGUEL ORTIZ ZARATE, ROBERTO GONZALEZ
SANTAMARIA



Introducción

Material y métodos

Resultados

Resultados

Conclusiones

- Masculino de 80 años de edad, antecedentes de importancia de HAS en control con metoprolol, ingresa a urgencias, con diagnóstico de hernia inguinal bilateral, de 7 años de evolución, no reducible ante maniobras manuales, por lo que se decide ingresar a plasta inguinal bilateral con técnica TAPP. Dentro de los hallazgos se encuentra hernia de amyand y hernia inguinal indirecta izquierda. Se realiza colgajo peritoneo, se coloca malla, de 15x15cm. Se fija malla con puntos simples con proveen 2.0.



DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018

CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

PLASTIA INGUINAL TIPO TAPP EN HERNIA DE AMYAND

STEPHANIE SERRANO COLLAZOS, MEZA JASSO MANUEL
ALEJANDRO, MIGUEL ORTIZ ZARATE, ROBERTO GONZALEZ
SANTAMARIA



Introducción

Material y métodos

Resultados

Resultados

Conclusiones

- En nuestro paciente se decide realizar plasta inguinal TAPP, por ser hernia inguinal bilateral primaria, así mismo al clasificarlo como Losanoff 1, decidimos no realizar apendicectomía por la edad del paciente. Siendo egresado a las 24 horas postquirúrgicas asintomático.



DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018

CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

PLASTIA INGUINAL TIPO TAPP EN HERNIA DE AMYAND

STEPHANIE SERRANO COLLAZOS, MEZA JASSO MANUEL
ALEJANDRO, MIGUEL ORTIZ ZARATE, ROBERTO GONZALEZ
SANTAMARIA



Introducción

Material y métodos

Resultados

Resultados

Conclusiones



DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018

CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ



ASOCIACIÓN MEXICANA DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA, A.C.

PLASTIA INGUINAL TIPO TAPP EN HERNIA DE AMYAND

STEPHANIE SERRANO COLLAZOS, MEZA JASSO MANUEL
ALEJANDRO, MIGUEL ORTIZ ZARATE, ROBERTO GONZALEZ
SANTAMARIA



Introducción

Material y métodos

Resultados

Resultados

Conclusiones

- La tecnica TAPP, presenta menor dolor postquirurgico, menor tiempo quirúrgico, reintegración rápida a sus labores y mejor calidad de vida a 3 semanas postquirurgicas.



DEL 1 AL 5 DE MAYO, 2018

CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA ENDOSCÓPICA
DR. ADRIÁN CARBAJAL RAMOS

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ